Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Regent

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Regent N.

Codice: 428

Sinonimi ufficiali:

Annotazioni: Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine ex art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 61/2010

Data di ammissione: 27/03/2009, decreto pubblicato sulla G.U. 146 del 26/06/2009

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Beschreibende Sortenliste 2015 - Reben, 2015

2.1. Descrizione

Incrocio Diana x Chambourcin

Giovane germoglio

001 - Apertura dell apice - 5) completamente aperto

003 - Intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell apice - 1/3) da molto bassa a bassa

004 - densità dei peli striscianti dell apice - 3/5) da bassa a media

Germoglio alla fioritura

351 - Vigoria del germoglio - 5) media

Foglia giovane

051 - Colore della pagina superiore del lembo - 3) bronzato

Foglia adulta

065 - Dimensioni del lembo -5) media

068 - Numero dei lobi - 2) tre

070 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo - 3) fino alla prima biforcazione

075 - Bollosità della pagina superiore del lmebo - 5) media

079 - Grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare - 3) leggermente aperto

Tralcio legnoso

103 - Colore prevalente - 2) brunastro

Infiorescenza

155 - Fertilità delle gemme basali - 5) media

Grappolo

202 - Lunghezza - 5) media

203 - Larghezza - 5) media

204 - Compattezza - 5) media

Acino

220 - Lunghezza - 5) media

221 - Larghezza - 5) media

223 - Forma - 2) sferoidale

225 - Colore della buccia - 6) blu nero

231 - Intensità della pigmentazione antocianica della polpa - 1/3) da molto bassa a bassa

233 - Rendimento in succo - 5/7) medio alto

236 - Sapore particolare - 5) diverso dall aroma moscato, foxy o erbaceo

2.2. Fenologia

301 - Epoca di germogliamento - 3/5) da precoce a media

302 - Epoca di fioritura - 3/5) da precoce a media

304 - Epoca di maturazione fisiologica dell acino - 5) media

2.3. Caratteristiche

Resistenze a fattori biotici

452 - Foglia: grado di resistenza alla Plasmopara - 7) elevata

453 - Grappolo: grado di resistenza alla Plasmopara - 7) elevato

455 - Foglia: grado di resistenza all Oidio - 7) elevata

456 - Grappolo: grado di resistenza all Oidio - 7) elevata

458 - Foglia: grado di resistenza alla Botrytis - 5/7) da media a elevata

459 - Grappolo: grado di resistenza alla Botryitis - 5/9) da medio ad elevata

Altre caratteristiche:

501 - Percentuale di allegagione - 5/7) da media ad elevata

504 - Peso di uva prodotta per m2 - 5) medio

506 - Acidità totale del mosto - 3/5) da bassa a media

2.4. Utilizzazione

Vinificazione

documento generato il 02-12-2020, 11:42

3. COLTIVAZIONE

3.1 Classificazione

3.1.1. In osservazione

Nella provincia di: Bolzano/Bozen, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

3.2.1. IGT

Alto Livenza, Colli Trevigiani, Conselvano, Trevenezie, Marca Trevigiana, Mitterberg*, Vallagarina, Veneto*, Veneto Orientale, Verona o Provincia di Verona o Veronese, Vigneti delle Dolomiti (in lingua tedesca Weinberg Dolomiten)*

** è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta*

4. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superfice vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
-	-	-	-	7

5. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2010 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2019	2.652	22.230	-	-
2018	900	-	-	-
2017	1.125	-	-	-
2016	624	-	-	-
2015	1.680	-	-	-
2014	2.280	11.340	-	-
2013	-	12.286	-	-
2012	-	267.324	-	-
2011	10.631	-	-	-
2010	28.000	-	-	-

** : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005*