Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Nermantis

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Nermantis N.

Codice: 920

Sinonimi ufficiali: F22p10 N.

Annotazioni: Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine ex art. 33, comma 6 della legge n.238/2016

Data di ammissione: 9/06/2020, decreto pubblicato sulla G.U. 152 del 17/06/2020

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Estratto dalla domanda di iscrizione della variet? al Registro Nazionale, presso il MIPAAF, 2020

2.1. Descrizione

La varietà è stata ottenuta per incrocio tra la varietà Teroldego (parentale femminile) e la varietà Merzling (parentale maschile). La varietà Merzling è una varietà ritenuta resistente a peronospora, oidio già iscritta al registro nazionale dei vitigni per vino della Germania.

La varietà F22P10 è stata selezionata in quanto risulta maggiormente resistente alle malattie fungine peronospora e oidio e mantiene un livello qualitativo interessante oltre a non presentare livelli di diglucosidi superiori ai livelli permessi nell attuale legislazione.

Le prove sono state eseguite dalla Fondazione E.Mach in Comune di S.Michele all Adige - loc. San Donà su terreno limoso-sabbioso ed in Comune di Rovereto - loc. Navicello, su terreno sabbioso.

Germoglio (osservazioni su germogli di 10-30 cm.)

001 - Apertura dell apice (30-60 cm) - 5) completa mente aperto

002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell apice - 1) assente

004 - Densità peli striscianti dell apice - 9) molto elevata

006 - Portamento (prima della legatura) - 3) semi-e retto

007 - Colore del lato dorsale degli internodi - 2) ver de o rosso

008 - Colore del lato ventrale degli internodi - 1) v erde

Cirri

016 - Numero viticci consecutivi - 1) 2 o meno

Foglia giovane (le prime sei foglie dell?apice, alla fioritura)

051 - Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia) - 1) verde

053 - Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia) - 9) molto elevata

Foglia adulta

065 - Dimensione del lembo - 7) grande

067 - Forma del lembo - 3) pentagonale

068 - Numero di lobi - 3) cinque

069 - Colore della pagina superiore del lembo - 5) verde medio

070 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo - 1) asse nte

071 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo - 1) asse nte

072 - Depressioni del lembo - 3) deboli

073 - Ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie - 1) assente

074 - Profilo del lembo in sezione trasversale - 4) revoluto

075 - Bollosità della pagina superiore del lembo - 1) nulla o molto bassa

076 - Forma dei denti - 3) entrambi i lati convessi

078 - Lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza - 5) medi

079 - Grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. - 3) aperto

080 - Forma della base del seno peziolare - 2) a parentesi graffa ({)

081-2 - Base del seno peziolare delimitata dalle nervature - 1) non delimitata

083-2 - Denti nei seni laterali superiori - 1) assenti

084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla

pagina inferiore del lembo - 7) elevata
090 - Densità peli striscianti sul picciolo - 3) bassa
091 - Densità peli eretti sul picciolo - 5) media
094 - Profondità dei seni laterali superiori - 5) med io

Infiorescenza

151 - Organi sessuali - 3) stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato
152 - Livello d?inserzione della prima infiorescenza - 2) 3° e 4° nodo
153 - Numero di infiorescenze per germoglio - 2) da 1,1 a 2 infiorescenze

Grappolo

202 - Lunghezza (escluso il peduncolo) - 7) lungo circa 200 mm.
203 - Larghezza - 1) molto stretto fino a circa 40 mm.
204 - Compattezza - 7) compatto
206 - Lunghezza del peduncolo del grappolo principale - 2) molto coto/corto (30-50 mm.)
207 - Lignificazione del peduncolo - 2)alla base
208 - Forma - 2) conico
209 - Numero di ali del grappolo principale - 2) 1 - 2 ali

Acino

220 - Lunghezza - 3) corto circa 13 mm.
221 - Larghezza - 3) stretto circa 13 mm.
223 - Forma - 2) sferoidale
225 - Colore della buccia - 6) blu nero
227 - Pruina - 5) media
228 - Spessore della buccia - 5) media
229 - Ombelico - 1) poco apparente
231 - Intensità pigmentazione antocianica della polpa - 1) nulla o molto debole
235 - Consistenza della polpa - 2) leggermente soda
236 - Sapore particolare - 1) nessuna
241 - Sviluppo dei vinaccioli - 3) completo

2.2. Fenologia (tra parentesi il dato della seconda località)

301 - Epoca di germogliamento - 21-apr (28-apr)
302 - Epoca di fioritura - 25-mag (31-mag)
303 - Epoca di invaiatura - 09-lug (15-lug)
304- Epoca di maturazione fisiologica - 04-set (11-set)
Dati produttivi (tra parentesi il dato della seconda località)
Fertilità reale (n° infior./germ.) - 2,12 (2,32)
Produzione di uva (g/ceppo) o kg. per metro di tralcio o di cordone - 2.220 (1.973)
N° grappoli/ceppo (alla vendemmia) - 14 (12)
502 - Peso medio del grappolo (g) - 158,5 (164,4)
503 - Peso medio acino (g) - 1,6 (1,7)
Peso legno potatura (g/ceppo) o kg /Ha - 366,6 (205,3)
Indice di Ravaz - 6,05 (9,61)
505 - Tenore I zucchero del mosto (°Brix) - 21,65 (21,68)
508 - pH - 3,3 (3,27)
Acidità totale (g/l) - 5,43 (5,40)
506 - Acidità totale del mosto (acido tartarico) (g/l) 6,51 (5,90)
Acido malico (g/l) - 2,47 (2,50)

2.3. Caratteristiche

Resistenze (aspetti macroscopici)
- Ad organismi nocivi - Resistente alla peronospora e meno sensibile a oidio
Comportamento all innesto - Regolare con su K5BB , SO4, 1103P

2.4. Utilizzazione

Per la vinificazione.

3. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2011 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2014	44.061	60.792	-	-

** : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005*